



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Alsóvégtagi érszűkület

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Érszűkület következtében a szervek, szövetek vér- és oxigén ellátásának zavara miatt jellegzetes tüneteket okozó működési zavar alakulhat ki.

A betegség kialakulását elősegítő tényezők:

- Dohányzás
- Zsírsanyagcsere zavar
- Fogamzásgátló szedése
- Cukorbetegség
- Magas vérnyomás
- Elhízás
- Stressz

Érszűkület tünetei, látható jelei:

- Járásra jelentkező alsóvégtagi fájdalom, mely pihenésre szűnik
- Súlyos esetben, nyugalomban is fennálló fájdalom, mely a láb lelógatására, vagy felülésre enyhül
- Zsibbadásérzés
- Sápadt bőrszín
- Hűvösebb tapintatú végtag
- Sorvadtabb bőr és végtagizomzat
- Gyérebb vagy hiányos lábszőrzet
- Deformált körmök
- Fekély, üszkösödés

A betegség megállapításához szükséges vizsgálati módszerek:

- A panaszos láb megtekintése, bőrhőmérséklet észlelése
- Helyzetváltoztatási próba, járáspróba
- Az erek megtapintása, hallgatása
- Ultrahang vizsgálatok, mely során artériás nyomásmérés is történik az érintett érben
- Érfestés kontrasztanyag beadás útján
- Szükség esetén izotóp, CT vizsgálat, capillar mikroszkóp
- Érsebészeti, bőrgyógyászati vizsgálat

Gyógykezelés:

- Rizikófaktorok kiiktatása
- Speciális értorna, járásgyakorlatok
- **Gyógyszeres kezelés:** vérlemezkék összecsapódását akadályozó gyógyszerek
véralvadásgátlók
értágító hatású anyagok
izomlazítók
- **Műtéti eljárások:** értágítás és vérrög eltávolítás katheterrel
erek felszabadítása külső nyomás alól



HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ
Belgyógyászati-Infektológiai Centrum
Belgyógyászati Osztály

az elzárt érszakasz újra megnyitása, pótlása, áthidalása, kiiktatása
tágító folt felvarrása
beteg árterület elhalt részek eltávolítása
végső esetben végtagcsonkolás

A gyógykezelés esetleges mellékhatásai, szövődményei:

- a. **Gyógyszeres kezelés esetén:** vérzések, bőrjelenségek,
gyomortáji fájdalom, szívritmus zavar
- b. **Érfestés esetén:** fájdalom, melegségérzése, szédülés, hányinger, hányás,
vényomásesés, ájulásérzés, szívritmuszavar, légzési zavar,
fehérje-vérvizelés
- helyi reakciók: érátzakadás, vérzés, thrombosis
 - allergiás reakciók: kiütés, bőrviszketés, gégevizenyő, vérzékenység
- A fenti reakciók kivédésének lehetőségei: jól hidratált, éhgyomorral levő betegen történjen, a vizsgálat megfelelő előkészítésben.
- c. **Műtéti beavatkozás esetén:** vérzés, varratelégtelenség, fertőzés, ér újra elzáródás