



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Megyei Bőrgondozóban elvégezhető kisműtétek

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

1. Elektrokauterizáció (elektromos úton való eltávolítás)

A kezelés lényege az elektromos árammal történő, bőrön lévő jóindulatú kinövések égetéssel való megoldása. Ide sorolandó: ér-eredetű elváltozás a bőrön, vírusos szemölcsök, bőr-függelékek, egyéb bőrön jelentkező jóindulatú elváltozások.

Mivel a kezelés fájdalmas, ezért minden esetben érzéstelenítést használunk.

Az érzéstelenítésre Lidocain injectiot alkalmazunk (ha a beteg nem Lidocain érzékeny).

Elektrokauterizáció után akkor számíthatunk tökéletes kozmetikai eredményre, ha a beavatkozás csak a bőr felületet érinti, mélyebb égetés esetén enyhe hegesezés képződik a kezelés helyén.

Közvetlenül a kezelés után hámosító, gyulladáscsökkentő sebellátást alkalmazunk

Fellépő szövődmények: utóvérzés a felületen erekből, amelyet egyszerű steril gézpárnával, nyomókötéssel elállíthatunk vagy vérzéscsillapító szivacsos (Spongostan) kötést helyezünk a sebre. Amennyiben anticoagulans terápiában részesül, a beavatkozás előtt közölje kezelő orvosával!

A felületen seb, ha nem megfelelő higiénés körülményeket biztosítunk befertőződhetnek. Ez esetben a kezelőorvost értesíteni kell.

A jóindulatú bőrkinövések eltávolítása nem akadályozza meg az újabb, hasonló bőrelváltozások megjelenését.

Égetéssel való eltávolítás csak olyan betegnél végezhető el, akinek szervezetébe fém tárgy nincs beültetve (pl. csavarok, pacemaker).

2. Mechanikai hatáson alapuló bőrsebészeti eljárás az excochleatio (kürettálás)

Kürettálással eltávolítható bőrelváltozások:

- vírusos szemölcsök (Molluscum contagiosum, Verruca plana juvenilis, Verruca vulgaris)
- bőrfüggelékek.

A kürettálást különböző méretű steril Volkman kanállal végezzük el. A bőr erőteljes megfeszítése mellett, gyors kaparó mozdulattal a bőrből kiemelkedő elváltozást a kanállal kiemeljük. Kisebb elváltozások esetében (vírus okozta szemölcsök) ha kis számban vannak jelen a bőrfelületen érzéstelenítés nélkül is dolgozhatunk.

Nagyobb képletek kezeléséhez helyi érzéstelenítés szükséges. Erre igen alkalmas a Chloroethyl spray használata, vagy közvetlen az elváltozás alá adott Lidocain injectio.

A vírus okozta bőrelváltozások esetében a kezelés az újabb elváltozások megjelenését nem akadályozza meg.

A betegeket kezelés után rendszeresen ellenőrzésre kérjük.

A keletkezett felületen sebet antibiotikus vagy hámosító kenőccsel kezeljük.

Az elváltozásokat fedőkötéssel látjuk el.

Az otthoni felülfertőződés megelőzése érdekében a sebek kezelését megtaníthatjuk a betegnek.