



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Fontos tudnivaló Prick teszttel vizsgált betegeknek

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Cél: Az I-es típusú allergiás reakcióra jellemző gyulladáshoz vezető jelenség előidézése a lehető legkisebb allergén mennyiséggel.

Prick-teszt – bőr karcolásos vizsgálata.

A vizsgálat indoklása:

- Rhinitis allergica (szénanátha)
- Asthma bronchiale extr.
- Urticaria (csalánkiütés)
- rovarcsípés allergia
- Dermatitis atopica
- allergiás bőrgyulladás.

A vizsgálat feltétele: tünetmentes bőrfelület.

Antihisztaminok, steroidok, szükség esetén pszichiátriai gyógyszerek kihagyása vizsgálat előtt. Ezeket jelezze a vizsgálat előtt.

Hol tesztelünk?

Az alkar hajlító felszíne a legmegfelelőbb a teszt elvégzéséhez. A bőrfelület fertőtlenítése nem szükséges.

Teszt kivitelezése:

- A teszthelyeket Solu prick tollal bejelöljük az alkar hajlító oldalára.
- A megfelelően kijelölt tesztelési helyekre 1-1 csepp allergén oldatot, illetve a végén a kontroll oldatokat felcseppentjük.
- A felcseppentett oldatokat egyszerhasználatos Prick-lándzsákkal megkarcoljuk. A szúrásokhoz steril lándzsát használunk.
- A beteget 20 percig kényelmesen ülve várakoztatjuk.
- 20 perc múlva a tesztoldatok letörlése.
- Prick-teszt értékelése szakorvos által, a pozitív és negatív kontrollt figyelembe véve.

Mellékhatások:

Prick tesztnél igen ritkán jelentkeznek nem kívánt lokális illetve általános reakciók, ezzel mégis számolni kell erősen szenzibilizált betegeknél.

Ha a rendelőből való távozás után a teszt helyén szokatlan reakciót észlel, jelentkezzen ambulanciánkon.