



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Fontos tudnivaló Epicutan teszttel vizsgált betegeknek

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Cél: A késői (IV. típusú immunreakción alapuló) kontakt érzékenység kimutatása. A beteg anamnezisét figyelembe véve, a bőrfolyamat hátterében kontakt allergének provokáló szerepének bizonyítása.

A vizsgálat indokltsága:

- kontakt dermatitisek/ekzema
- fotokontakt dermatitis
- dyshidrosis
- kontakt urticaria
- perioralis dermatitis (száj körüli bőrgyulladás).

A vizsgálat feltétele: tünetmentes bőrfelület.

Antihisztaminok, steroidok, szükség esetén pszichiátriai gyógyszerek kihagyása vizsgálat előtt.

A vizsgálat 1 hetet vesz igénybe. Az orvos által megjelölt időpontokban szükséges megjelenni.

Az epicutan teszttel a betegek túlérzékenységét vizsgáljuk különböző anyagokkal szemben. Ezért ezeket az anyagokat tartalmazó tesztsíkot ragasztunk a hátra. Ahhoz, hogy helyesen értékelhessük, kérjük a következő szabályokat betartani:

1. A tesztsíkot csak a szakrendelésen távolíthatjuk el a hátáról!
2. Amíg a tesztsík a hátra van ragasztva, nem szabad a hátat megmosni, zuhanyozni. Nem érheti a hátát természetes, vagy mesterséges fény (napozás, quarc).
3. Kerülje el a testi megerőltetést, ami izzadást okoz. A tesztsík ezáltal leválhat, vagy alatta a bőr begyulladhat.
4. Ha a tesztsík minden elővigyázatosság ellenére leválik, kérjük ez esetben is a számozás megőrzését.
5. A tesztsíkot csak az első kontroll vizsgálat során távolítjuk el. Megmosni, vagy napoztatni a hátat csak az utolsó vizsgálat után szabad.
6. Kérjük a következő időpontokban jöjjön vizsgálatra (leolvasásra) 48 óra, 72 óra, 96 óra, 1 hét múlva.
7. Kérjük a tesztsík mellé írt számokat szükség esetén naponta többször tollal, vagy filctollal megerősíteni.
8. Ha érzékenység áll fenn, kenőcsöt, illetve allergia gyógyszert akkor sem szabad használni a vizsgálat befejezéséig.

Ha Ön egy vagy több anyagra allergiás, akkor azon a helyen, ahol az anyag a bőrrel érintkezett bőrpír és viszkető kiütés keletkezik. Ez az anyag az Ön betegségének kiváltó oka lehet. A bőrküítés és a bőrpír néhány nap alatt eltűnik.

FONTOS!

1. Az utolsó leolvasást követően 3 héten belül a tesztsík helyén bőrpír vagy más elváltozás keletkezik, kérjük tájékoztasson bennünket, jelentkezzen kontroll vizsgálatra!
2. Kérjük tudassa azt is, ha a vizsgálat előtt és alatt bármilyen gyógyszert szedett, vagy külsőleg használt!