



**BETEGTÁJÉKOZTATÓ**  
**Érfestéses vizsgálat (angiográfia)**

**Kedves Betegünk!**

Kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mert ennek ismeretében tudja aláírni a vizsgálatához szükséges beleegyező nyilatkozatot.

**Angiográfias vizsgálat:**

A beavatkozást erre szakosodott radiológus orvos végzi.

Az angiográfias vizsgálat során a vizsgálandó ereket kontrasztanyaggal (érfestő anyaggal) töltjük fel - katéteres módszerrel - és erről speciális röntgen berendezéssel sorozatfelvételt készítünk.

Az érrendszerbe bőrön át hatolunk be (kis műtétnek számít), ami bőrfertőtlenítés és helyi érzéstelenítés után történik. A katéter bevezetésének helye lehet combhajlat, könyökhajlat és csukló tájék. A katéter bevezetése után, azon keresztül kerül a kontrasztanyag a véráramba.

A vizsgálat végén a szúrás helyére nyomókötést helyezünk, amit a behatolás helyétől függően 6-24 óra múlva lehet eltávolítani.

Az érstatusz feltérképezése után tervezhető az esetleges terápiás beavatkozás: pl.: beszűkült vagy elzáródott érszakasz megnyitása, tágítása, esetleg kóros érképlet vérkeringésből történő kirekesztése.

**Felkészülés a vizsgálatra:**

A vizsgálat eredményességét segíti a megfelelő előkészítés.

Az angiográfias vizsgálat előtt 5-6 órával szilárd étel fogyasztását már kerülni kell, mert kontrasztanyag beadása esetén hányingert, hányást idézhet elő.

A beavatkozást megelőzően (2 órával) sok folyadék fogyasztása javasolt, ami a vizsgálat kimenetelét pozitívan befolyásolja.

Cukorbetegséget kezelő gyógyszerek közül a metformint tartalmazó készítményeket a vizsgálat előtti és utáni két napon fel kell függeszteni! Az insulin beadását bejelentkezéskor egyeztetni kell a szakszeméllyel!

Vérhígító szedését a kezelőorvossal megbeszélve kell szüneteltetni!

A vényomáscsökkentő és szívműködésre ható gyógyszerek szedhetők az eljárás ideje alatt.

Gyógyszerérzékenységéről tájékoztatást kérünk!

**Az érfestés elvégzéséhez szükséges laborparaméterek:**

véralvadási értékek (INR, prothrombin)

vesefunkció (GFR)

**A vizsgálat nem fájdalmas, csak kellemetlen!**

**Szövődmények:**

A szúrás helyén előfordulhat véraláfutás.

A vizsgálatot kísérheti émelygés, hányinger/hányás (főleg étkezést követően).

A kontrasztanyag érpályába juttatása forróság érzettel jár, amely gyorsan szűnik.

A nyomókötéssel ellátott végtagot hajlítani, terhelni nem szabad, ágynyugalom javasolt!

A vizsgálatot követően az esetleges szövődmények felismerése és elhárítása érdekében a betegeket a vizsgálatra küldő osztályon, legkevesebb 4 órán keresztül megfigyelik.

Kedves Betegünk!

Ha Önben a vizsgálatban kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, készséggel állunk rendelkezésére.

Az Angiográfias laboratórium munkatársai remélik, hogy ezzel az ismertetővel sikerült eloszlatni félelmeit és Ön egy eredményes vizsgálaton lesz túl.

**Angiográfias Labor munkatársai**