



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Katéteres értágítás és érprotézis behelyezés

#### Kedves Betegünk!

Kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mely az Önön tervezett beavatkozásról nyújt felvilágosítást, mert ennek ismeretében tudja aláírni a vizsgálathoz szükséges beleegyező nyilatkozatot.

#### **Értágítás (percutan transluminális angioplastica), érprotézis (stent implantatio):**

A beavatkozást erre szakosodott radiológus orvos végzi.

A vizsgálatot megelőzően megtörtént az érstátusz feltérképezése, mely szükségessé tette ezt a terápiás beavatkozást (beszűkült vagy elzáródott érszakasz megnyitás, tágítás, érprotézis behelyezés), a keringés helyreállítását.

Az intervenció, invazív radiológiai beavatkozások olyan radiológiai eljárások, melyek során képalkotó készülék segítségével a kérdéses elváltozást tudjuk ábrázolni.

Steril körülmények között a szúrás helyét lefertőtlenítjük, helyi érzéstelenítőt adunk. A szúrás helye lehet combhajlat, könyökhajlat és csukló tájék. Vezetődróton a kérdéses érterületig juttatjuk el a ballonkatétert, melyet a biztos pozicionálás után néhány másodpercig folyadék nyomással feltöltünk így a szűk érszakasz kitágul. Ha a ballon tágítás nem elegendő, érprotézist (fémháló) helyezünk be, ami tartósan kisámfázza, nyitva tartja az eret.

Vizsgálat végén a szúrás helyére nyomókötést helyezünk, amit a behatolás helyétől függően 6-24 óra múlva lehet eltávolítani.

#### **Felkészülés a vizsgálatra:**

A vizsgálat eredményességét segíti a megfelelő előkészítés.

A beavatkozás előtt 5-6 órával szilárd étel fogyasztását már kerülni kell, mert kontrasztanyag beadása esetén hányinger/hányás fordulhat elő.

A terápiát megelőzően (2 órával) bő folyadék fogyasztás javasolt, ami a vizsgálat kimenetelét pozitívan befolyásolja.

Cukorbetegséget kezelő gyógyszerek közül a metformint tartalmazó készítményeket a vizsgálat előtti és utáni két napon fel kell függeszteni! Az insulin beadását bejelentkezéskor egyeztetni kell a szakszeméllyel!

Vérhígító szedését a kezelőorvossal megbeszélve kell szüneteltetni!

A vényomáscsökkentő és szívműködésre ható gyógyszerek szedhetők az eljárás ideje alatt.

Gyógyszerérzékenységéről tájékoztatást kérünk!

#### **Az érfestés elvégzéséhez szükséges laborparaméterek:**

- véralvadási értékek (INR, prothrombin)
- vesefunkció (GFR)

**A vizsgálat nem fájdalmas, csak kellemetlen!**

#### **Szövődmények:**

A szúrás helyén előfordulhat véraláfutás.

A vizsgálatot kísérheti émelygés, hányinger/hányás (főleg étkezést követően).

A kontrasztanyag érpályába juttatása forróság érzettel jár, amely gyorsan szűnik.

A nyomókötéssel ellátott végtagot hajlítani, terhelni nem szabad, ágynyugalom javasolt!

A vizsgálatot követően az esetleges szövődmények felismerése és elhárítása érdekében a beteget az beküldő osztályon megfigyelik.



**HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ**  
**Radiológiai Osztály**

Kedves Betegünk!

Ha Önben a vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, készséggel állunk rendelkezésére.  
Az Angiográfias laboratórium munkatársai remélik, hogy ezzel az ismertetővel sikerült eloszlatni félelmeit és Ön egy eredményes vizsgálaton lesz túl.

**Angiográfias Labor munkatársai**