



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Tályogmegnyitás a testfelszínen

Tisztelt Hölygem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség és annak kezelése

A vizsgálatok az Ön esetében testfelszíni tályogot állapítottak meg. Ilyen tályogok általában baktériumok, gombák behatolása következtében alakulnak ki. Előfordulhat, hogy a test belsejében lévő fertőző góccal áll összefüggésben a tályog keletkezése. Felismerhető gyulladáso jelesek gyakran először a nyirokcsomókban jelennek meg. Az ilyen gyulladás folyamán szövetszétés alakul ki, amelyet a szervezet tályogfállal próbál körülvenni. A kezeletlen tályogok a légyszekben a szomszédos csontokon, ízületekben terjednek tova, károsíthatják az izmokat, idegeket és életveszélyes vérmérgezéshez vezethetnek. Ha a tályog kifelé vagy a testüregbe (húgyhólyag, bél) áttör, átmenetileg a panaszok csökkenhetnek, azonban ezzel a tályog nem szűnik meg. Nedvedző gennyos sipoly, rúttó heg maradhat vissza.

Injekciós tüvel történő punctio által a tályog általában csak részlegesen üríthető ki, tartós gyógyulást így nem tudunk elérni. Ugyancsak nem vezet eredményre a gyógyszeres kezelés. Ezért műtétet ajánlunk.

A műtét

Vagy altatásban, vagy helyi érzéstelenítésben a tályognak megfelelően a bőrön metszést ejtünk, hogy a genny eltávozhassék. Az elhalt légyszekt, esetleg csontszövetet ilyenkor eltávolítjuk. A környezetbe (bélbe, csontokkal) vezető sipolyokat feltárjuk, megszüntetjük.

A műtéti sebztést nem varrjuk be, igyekszünk elérni, hogy a gyógyulás a tályog aljáról induljon ki. A gyógyulás érdekében, mélyebb üregek esetében, drainsövet helyezünk be. Bizonyos esetekben ún. öblítő draint alkalmazunk.

Műtét után

A tályog elhelyezkedésétől függően (pl. végtagokon) sínezést alkalmazunk nyugalomba helyezés céljából. A végbélnyílás körül elhelyezkedő tályogok esetében ülőfürdőket, hashajtókat alkalmazunk.

Lehetséges szövődmények

A műtéti eljárás teljes sikeréért és szövődménymentességéért az orvos felelősséget nem vállalhat. Igen ritkán, bizonyos elhelyezkedésű tályogoknál erek és idegek sérülhetnek. A tályognyitás utáni első illetve második napon előfordulhat erősebb utóvérzés, melyet sebészileg kell ellátunk. Ezáltal a sebgyógyulás zavart szenvedhet. Szerencsétlen esetben zsugorító hegek az ízületek mozgását is korlátozhatják.

A kezelés kilátásai

Általában a tályogok megnyitása után a panaszok gyorsan megszűnnek, a beteg gyorsan gyógyul. Előfordulhat azonban, hogy a gyógyulás hetekig tart, utóvizsgálatokra van szükség, gyulladáso maradványgócok, sipolyjáratok felderítésére.



HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ
Sebészeti és Érsebészeti Osztály

Kérjük segítsen nekünk:

- vizsgálatainknál és kezelés közben;
- az önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában;
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából;
- az orvosi utasítások pontos betartásával.