



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Lágyéksérv operáció

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

A lágyéksérv a hashártya „kiboltosulása”, amely a hasfal körülhatárolt hiányán (sérvkapu) keresztül az izmok és a lágyékszalag között történik. Ezen csatornában férfiaknál a herevezeték, nőknél a méh függesztő szalagja van. A herezacskóban gyakran hasi szervek pl. belek foglalnak helyet. A hashártya kiboltosulása (sérvtömlő) leérhet a herezacskóba (scrotalis sérv). A lágyéksérv lehet egy vagy kétoldali. Általában látható vagy érezhető, s mindaddig, míg ki nem záródik, enyhe panaszokat szokott okozni. Lehet veleszületett, de keletkezhet később is.

A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei

A sérvkapu magától nem záródik. A sérvkötők csupán segédeszközök a betegség gyógyulásához, javulásához nem vezetnek. A lágyéksérvet tanácsos már szerény panaszok esetén is operálni. Szák sérvkapu esetén a sérvtartalom kizáródhat, ami bélelzáródáshoz, hashártyagyulladásához vezethet.

Utóbbiak a műtét egyébként nem jelentős veszélyeit nagymértékben növelik, ilyenkor sürgős beavatkozásra van szükség.

Műtéti eljárások

A beavatkozás helyi, vezetéssel (gerinc), ritkán általános érzéstelenítésben történik. A sérvtömlőt a lágyékon ejtett metszéssel szabaddá tesszük, alákötjük és eltávolítjuk. A sérvtartalmat (pl. vékonybélkacsok, cseplesz) a hasüregbe visszahelyezzük. Nőknél a sérvkaput (lágyékcsatornát) teljesen elzárjuk. Férfiak esetében varratokkal annyira megkisebbitjük, hogy sérv újra nem keletkezhessek.

Lehetséges szövődmények

Valamely beavatkozás abszolút veszélymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. Az orvosi beavatkozás általános veszélyei pl. fertőzések, thrombosisok, embóliák (érelzáródások, szerv, ideg, érsérülések, utóvérzések) azonban - hála az orvostudomány fejlődésének - egyre ritkábbak. Ma már jóval többet tudunk tenni ellenük mint régebben. Szokatlanul nehéz körülmények között (pl. kizárt sérv) a herevezeték a herét ellátó érhálózat sérülhet, ami átmeneti duzzadással, ritkán a here megkisebbedéssel, sőt a here elvesztésével is járhat. Nagyon ritkán a műtéti területen kialakuló hegesezés a herevezeték beszűkítheti, ez azonban csak akkor vezet magtalanúsághoz, hormonális zavarokhoz, ha a másik oldali here, herevezeték nem működőképes. Kizárt sérv esetében a kizáródott bélszakasz olyan sérült lehet, hogy esetleg annak eltávolítása válik szükségessé.



Gyógyulási kilátások

Időben végzett műtét esetében a gyógyeredmények igen jók. Sérv kiújulása lehetséges, különösen, ha általános szövetgyengeség áll fenn. Kerülje ezért a műtét után a túl korai megerőltetést, tartsa magát pontosan az orvos által adott utasításokhoz. Ezen rövid ismertetésben csupán a leglényegesebb szempontokra térhettünk ki. Kérjük ezért esetleges további kérdéseivel forduljon kezelőorvosához.

Kérjük segítsen nekünk:

- vizsgálatainknál és kezelés közben;
- az önnek feltett kérdések pontos megválaszolásában;
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából;
- az orvosi utasítások pontos betartásával.

Kérjük beleegyezését

Hogy a műtétet Önön elvégezhessük, továbbá, hogy amennyiben a műtét közben annak tervét, kiterjedését meg kell változtatnunk, azt megtehessük. Utóbbira azért van szükség, mivel a műtét felfüggesztése, a kiterjesztés elhalasztása az Ön számára újabb megterhelést (pl. újabb altatás) tenne szükségessé.