



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Műtétek heveny hasnyálmirigy gyulladásban

#### Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

#### A betegség

A vizsgálatok az Ön esetében heveny hasnyálmirigy gyulladást állapítottak meg. A hasnyálmirigy termeli és szállítja az emésztéshez szükséges emésztőnedveket, amelyeket vezetékrendszerén keresztül a bélbe bocsát, továbbá cukor anyagcsere hormont termel, mely közvetlenül a vérbe kerül.

A hasnyálmirigy gyulladásait az epeutak betegségei (pl. epekövesség), vagy táplálkozási hibák okozhatják. A heveny gyulladás megjelenhet egyszerű vizenyő formájában, de bekövetkezhet a mirigy „önemésztő” formájában is.

#### A betegség veszélyei, a kezelés lehetőségei

Az enyhébb gyulladások csaknem mindig meggyógyíthatók diétával és gyógyszerekkel. Amennyiben epekőbetegség az ok, annak mielőbbi műtéti megoldása javallt. Gyakran a súlyosabb gyulladások is eleinte belgyógyászati kezelésben részesíthetők. A hasnyálmirigy és a zsírszövet önemésztődése azonban súlyos szövetszéteséshez és vérzéshez vezethet. Az eközben szabaddá váló anyagok a keringés összeomlását, életveszélyt okozhatnak.

Az Ön esetében műtétet ajánlunk, mivel a károsodott szövetrészek eltávolítása adja a legjobb lehetőséget a gyógyuláshoz.

#### A műtét

Általános érzéstelenítésben nyitjuk meg a hasüreget. Csak ezután állapíthatjuk meg, hogy milyen beavatkozás szükséges.

Számításba jönnek:

- Az elhalt szövetek eltávolítása, a vérzések csillapítása.
- A hasnyálmirigy részleges eltávolítása.
- Öblítő és szívódrainek behelyezése a mérgező anyagok eltávolítása és az epeutak esetleges akadályainak (epevezeték-kövesség) a megszüntetése.

#### Lehetséges szövődmények

A kezelés eredményességéért, a teljes rizikómentességért a tudomány mai állása szerint teljes felelősséget orvos nem vállalhat.

A szövődmény típusát és súlyosságát a betegség oka, annak kiterjedése, továbbá a szükséges műtéti beavatkozás határozzák meg.

Amennyiben a hasnyálmirigy varratai elégtelenné válnak, az emésztőnedvek a hasüregbe kerülhetnek és ott veszélyes gyulladást (peritonitist), bélbénulást, továbbá különböző szervek (máj, vese) károsodását okozhatják.



## HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ

### Sebészeti és Érsebészeti Osztály

A beavatkozás alatt, vagy után vérzések léphetnek fel, amelyek vérátömlesztést, esetleg ismételt műtétet tehetnek szükségessé.

Hosszabb idővel a műtét után a hasüregi bélösszenövések okozhatnak zavarokat. Megjegyezzük, hogy a műtét a hasnyálmirigy és a zsírszövet előrehaladó önmérsztését nem minden esetben tudja megállítani.

Kérjük, hogy amennyiben további információra van szüksége, forduljon bizalommal kezelőorvosához.

#### **Kérjük segítsen nekünk:**

Vizsgálatainknál és kezelés közben;

Az önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában;

Adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából;

Az orvosi utasítások pontos betartásával.