



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Beavatkozás az epehólyagon és az epeutakon

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

Az elvégzett vizsgálatok az Ön esetében az epehólyag, illetve az epeutak betegségét állapították meg. Az epehólyag megbetegedését leggyakrabban az epekővesség és az utóbbi által okozott gyulladás képezi. Sokkal ritkábban fordulnak elő ezen a téren daganatok.

Az epehólyag a máj alsó felszínén rögzített és tartalma a máj által elválasztott epe, amely az epeutakon keresztül ürül a bélbe. Elsősorban a zsírok emésztéséhez szükséges az emésztőnedv.

A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei

Az epekővesség súlyos megbetegedéshez, elsősorban az epehólyag és az epeutak gyulladásához sárgasághoz (az epeutak elzáródása), az epehólyag átfürödéséhez, következményes epés hashártyagyulladásához, epehólyag-bélsipolyhoz, ritkán rákos átalakuláshoz vezethet. Hosszú ideje fennálló epekővesség következménye lehet az epehólyag falának rákos átalakulása is. Egyes esetekben az epeutakban lévő kő a szájon át levezetett cső (endoscopia) segítségével, műtét nélkül is eltávolítható. Az esetek többségében azonban az epekővesség műtéti megoldást igényel.

Azonnali beavatkozás szükséges az epehólyag gennyes gyulladásakor, amely a fal átfürödése által hashártyagyulladást válthat ki. Az is előfordul, hogy az epehólyagfal és a bél között keletkezett sipolyon a kő a bélbe ürül és bélelzáródást igényel. Nem sokáig halasztható a műtét az epeutak kő vagy egyéb ok létrehozta elzáródáskor sem. Ilyenkor vezető tünet a sárgaság.

Műtéti eljárások

A beavatkozás általános érzéstelenítésben történik. Az epehólyagot általában a jobb felső hasfélben vezetett ferde metszéssel tárjuk fel. Kő vagy kövek, gyulladás esetében általában epehólyag eltávolítást végzünk. Epeút kövek esetében, az epeutak szűkületekor a beavatkozást az epeutakra is kiterjesztjük. A műtét alatt az epeutakról röntgen vizsgálatokat is végzünk. Néha néhány napra vékony gumicsövet vezetünk az epeutakba, amit később fájdalommentesen eltávolítunk.

Lehetséges szövődmények

Valamely sebészeti eljárás eredményéért, illetve teljes szövődménymentességéért az orvos felelősséget nem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a vérrögképződés, annak tovasodródása, sebgyógyulási zavarok - hála az orvostudomány fejlődésének ma már sokkal ritkábban fordulnak elő. Többet is tudunk tenni mint régebben.

Súlyos műtéti szövődmények epehólyag-eltávolítás alatt és után nagyon ritkák (pl. sárgaság, hashártyagyulladás), vagy a szomszédos szervek (pl. nyombél, a gyomor, hasnyálmirigy) is betegek.



HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ

Sebészeti és Érsebészeti Osztály

Gyógyulási kilátások

Epebetegségek esetében általában jók a gyógyeredmények, kicsi a műtéti kockázat. Az epehólyag eltávolítása nem befolyásolja helyrehozhatatlanul az emésztőrendszer munkáját. Jelentősége van e szempontból a betegség kiterjedésének, a beteg általános állapotának, korának és számos más tényezőnek is.

Kérjük segítsen nekünk:

- vizsgálatainknál és kezelés közben;
- az önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában;
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából;
- az orvosi utasítások pontos betartásával.