



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Gyomordaganat operáció

#### Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

#### A betegség

Az eddigi vizsgálatok az ön esetében gyomordaganat lehetőségét vetették fel.

A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei

Diétás vagy gyógyszeres kezeléstől eredmény nem várható, ezért műtétet kell végeznünk. Utóbbi nélkül életveszélyes szövődmények következhetnek be. A daganat vérezhet. Amennyiben a vérzést nem sikerül gyorsan csillapítanunk, életveszélyes állapot következik be. A daganat növekedése által a gyomrot úgy szűkítheti, hogy a táplálkozást lehetetlenné teszi. A daganat a környező szöveteket is beszűrheti. A műtétet mielőbb és olyan radikalitással kell végeznünk, hogy az egész növedéket eltávolítsuk.

#### Műtéti eljárások

1. A gyomor részleges eltávolítása (resectio).

Ez esetben a gyomor 2/3-át - vagy valamivel többet - távolítjuk el. A gyomor csonkját varratokkal a vékonybéllel egyesítjük.

2. Teljes gyomorkiirtás (gastrectomia)

Ennek szükségessége a daganat kiterjedésétől függ. Végzéskor összeköttetést létesítettünk a nyelőcső és a vékonybél között.

#### Lehetséges szövődmények

Valamely beavatkozás abszolút veszélymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. Az orvosi beavatkozás általános veszélyei pl. fertőzések, thrombosisok, embóliák (érelzáródások, szerv-, ideg-, érsérülések, utóvérzések) azonban - hála az orvostudomány fejlődésének - egyre ritkábbak.

Ma már jóval többet is tudunk tenni ellenük, mint régebben. Minden emésztőszervi szájadék készítése esetében a varratok elégtelenné válhatnak, aminek a következménye hashártyagyulladás lehet. A varratok helyén vérzések, duzzanatok keletkezhetnek. Létrejöhethé bélbénulás, bélelzáródás, melyek azonnali újabb műtétet tehetnek szükségessé. Eredményes műtét után is ritka esetekben a későbbiek folyamán a gyomor-bél összeköttetés zsugorodhat. A táplálék-továbbítás más betegek esetében túl gyors lehet. Létrejöhethé nyelőcső-gyulladás, ha a béltartalom oda-vissza folyik. A betegség gyógyításának az eredménye a mielőbbi kezeléstől és a minél radikálisabb műtéttől függ. Ilyen szempontok mellett a daganatos betegséget teljesen meg tudjuk gyógyítani.



**Kérjük segítsen nekünk**

- vizsgálatainknál és a kezelés közben;
- az önnek feltett kérdések gondos megválaszolásával;
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából (pl. foglalkozási ártalmak);
- az orvosi utasítások pontos betartásával.

**Kérjük beleegyezését**

- hogy a műtétet Önön elvégezhessük.
- továbbá, hogy amennyiben a műtét során annak tervét, kiterjedését meg kell változtatnunk, azt megtehessük. Utóbbira azért van szükség, mivel a műtét felfüggesztése, a kiterjesztés elhalasztása az Ön számára újabb megterhelést (pt. újabb altatás) tenne szükségessé.