



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A szemhéj hibás állásai és a szemhéjon előforduló egyéb elváltozások

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

I. A szemhéj hibás állása:

A szemhéj élettani, jó helyzete szükséges ahhoz, hogy a szemgolyót megfelelően tudja védeni a külső behatásokkal szemben. Hibás állások:

1. szemhéj szélének befordulása
2. szemhéj szélének kifordulása
3. szemhéjcsüngés
4. arcidegbénulás okozta elégtelen szemhéjzárás

1. Szemhéj szélének befordulása:

Főleg az idős kor betegsége, a szemhéj szöveteinek meglazulása következtében. A szempillák érintik a szem felszínét, ezzel állandó gyulladást, szűrő érzést okozva. A szaruhártyán hámszárazságot, majd kezelés nélkül fekélyt okozhat látásromlással.

Megoldása műtéti, helyi érzéstelenítésben (bőr alá adott inj.) történik. A műtét fájdalommentes.

Lényege a szemhéj szélénél a pillasor alatt metszést ejtünk és a szemhéjszéli izmok rostjait részben eltávolítjuk, majd a bőrt összevarrjuk. Szükség esetén a szemhéj bőréből is eltávolítunk egy részt. A műtét után a pillasor alatti finom heg alig észrevehető.

2. Szemhéj kifordulás:

Szintén idősebb korban fordul elő. Sokszor könnyezés érzése miatti állandó törölgetés okozza. A kifordult alsó szemhéji kötőhártya bevéresedik, megvastagszik és állandó panaszt okoz, fokozott könnyezéssel.

Műtét: helyi érzéstelenítésben a szemhéját megrövidítjük egy háromszög alakú szemhéjrész kimetszésével. Nem felszívódó varratot használunk, amit 7-10 nap múlva eltávolítunk. Addig a szemet mosni nem szabad, csak az előírt kezelést kell pontosan betartani.

3. Szemhéjcsüngés:

A szemhéj emelő izom elégtelen működése, mely lehet veleszületett, vagy idegbénulás vagy ideggyengeség következtében alakul ki. Műtetre akkor van feltétlenül szükség, ha a felső szemhéj a pupilla (szembogár) területét eltakarja.

Többféle műtéti megoldás van, lényege a szemhéj működésének áthárítása a homlokizomzatra vagy az izmok megerősítése. Műtét után a varratokat 3-10 nap múlva távolítjuk el. Helyi érzéstelenítésben (szemhéj bőre alá adott inj.) de gyermekeknél altatásban végezzük.

4. Arcidegbénulás okozta elégtelen szemrészáródás:

Beidegzés hiánya miatt a szemrés elégtelenül vagy nem záródik. Kiszárad, hámszárazságot, majd fekély alakulhat ki. Ezért kenőcsöt, gélt alkalmazunk a kiszáradás és következményei megakadályozására. A szemhéj szélét (kívül) összevarrjuk átmenetileg a szemrés szűkítésére. A műtét helyi érzéstelenítésben (szemcsepp és bőr alá adott inj.) történik. A műtét fájdalommentes. 7 nap múlva varratszedésre kell visszajönni.

Amennyiben az idegbénulás kezelésre megszűnik a szemrés ismét műtéttel kinyitható.



II. A szemhéjon és környékén különböző jó és rosszindulatú daganat keletkezhet.

Ezeket műtéttel el kell minél előbb távolítani. Kis elváltozást csak kimetszünk majd összevarrjuk (általában) felszívódó varrattal. Nagyobb elváltozás esetén bonyolultabb plasztikai műtetre lehet szükség. Helyi (bőr alá adott lnj.) érzéstelenítésben végezzük. A műtét fájdalomtalan, minden esetben szövettani vizsgálat történik.

Szövődmény: alávérzés, esetleg kiújulás. Kezelést, ellenőrzést be kell tartani. Ha a sebvonalban kiújulást észlel, azonnal forduljon szemorvoshoz.