



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Szaruhártya gyulladás, fekélyes

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A szaruhártya a szem elülső, óraüvegszerűen átlátszó része. Ennek gyulladását okozhatja baktérium vagy vírus (pl. herpes vírus)

A gyulladás tünete: a szaruhártyán fehér vagy sárgás apró területek jelennek meg, fénykerüléssel, könnyezéssel és szűrő érzéssel. A fájdalmat a kísérő szivárványhártya izgalom is fokozza. Kezelése szemész szakorvos feladata. Gyakran előzi meg valamilyen sérülés (idegentest, stb.) A gyulladás miatt a szaruhártya átlátszósága csökken, ami, látásromlással járhat. Ha a szaruhártya széli részein van a betegség: a látás jó maradhat.

Ha a gyulladás területén a hám lelékődik, fekély alakulhat ki. A gyulladás helyén különböző mértékű szaruhártya homály maradhat vissza, ami a látást véglegesen is ronthatja.

Kezelés: antibiotikus vagy vírusellenes cseppek, kenőcsök.

Pupilla (szembogár) tágítás nagyon fontos. (Ez a kezelés alatt homályosabb látást okoz, de kihagyása után elmúlik). Általánosan is adunk antibiotikumot súlyosabb esetben. Később steroid cseppeket is adunk a gyógyulás után (a homály vékonyítására).

Fontos a kórházi zárójelentésben feltüntetett kezelés pontos betartása és szoros szemészeti ellenőrzés.

A nem megfelelő kezelés esetén a szaruhártya fekély helyén a szemburok átszakadhat és a szem belső részei előesve kifejezett hegesedés alakulhat ki látásromlással.

A nem megfelelően kezelt szaruhártya ereződik és átlátszatlaná válik.