



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### A lencse hátsó tokjának megvastagodása szürkehályog műtét után

**Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!**

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Ma a szürkehályog műtét lencsebeültetéssel történik. A műlencsét a saját, kitisztított lencsetokba helyezük műtét során. Műtét után a hátsó lencsetok elhomályosodhat, megvastagszik. Ilyenkor a látás fokozatosan romlik. Ilyen panasszal az operáló orvosnál kell jelentkezni, lézerkezeléssel a panasza megszüntethető.

YAG lézerkezelésre az esetek 20-25%-ban van szükség. Helyi érzéstelenítésben végezzük, ülő helyzetben. A beavatkozás fájdalomtalan. A készüléknél nyugodtan, mozdulatlanul kell ülni. A szemgolyóra egy kontaktlencsét helyezünk fel, ezen át a hátsó, megvastagodott tokot magas energiájú lézerrel középen kivágjuk. A hátsó tok részecskéi azonban a szem belsejébe jutva gyulladást, átmeneti magasabb szemnyomást okozhatnak. Ritkán látóideghártya ill. műlencse sérülést okozhat a lézer energia. Pár nap múlva kontroll vizsgálat szükséges, amit be kell tartani, a helyi szteroid szemcsepp alkalmazása mellett.

Az esetek egy részében a vastag tok nem vágható ki együlésben, ilyenkor a lézerkezelést meg kell ismételni.

Már a kontroll vizsgálatnál, ha szövődmény nem lép fel, a beteg ugyanúgy lát ismét, mint a szürkehályog műtét után.

Ha a későbbiekben bármilyen szemészeti panasza van, forduljon haladéktalanul operáló orvosához.