




BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A hátsó hüvelyboltozaton keresztül történő punkcióról (Douglas-punctio)

Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Önnél a nőgyógyászati vizsgálat olyan elváltozást igazolt, amikor a szabad hasüregben nagyobb mennyiségű folyadék jelenlétére van gyanú vagy folyadéktartalmú tömlő (cysta) tartalmának



leszívása szükséges. Előzetesen elvégzett laborvizsgálatok után a műtétnapján reggel 7³⁰-kor éhgyomorral történik a felvétel a nőgyógyászati ambulancián. Ha rendszeresen szed gyógyszereket, kérjük, hogy azokat a kora reggeli órákban egy korty vízzel vegye be. A beavatkozást rövid altatásban végezzük. Hüvelyi feltárásból a hátsó hüvelyboltozaton keresztül vékony tűvel szúrunk a szabad hasüregbe. Az esetek nagy részében ez egyszerűen elvégezhető. Nehézségek esetén ultrahangvizsgálat segíti a jobb tájékozódást a kismedencében. A lebocsátott folyadék vizsgálata után elképzelhető, hogy azt követően újabb műtéti beavatkozásra, szükség szerint a has megnyitására lesz szükség, a felismert betegség megfelelő kezelése érdekében.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak szövődmények (vérzés), a tömlő környezetében lévő szervek (bél, erek) sérülése. Az esetleges szövődményeket a beavatkozások kockázataként kell tekintenie, melyek elkerülésére mindent elkövetünk. A műtét után szükséges megfigyelés alatt általában ezek a szövődmények kiderülnek és van lehetőségünk elhárítani azokat. Szövődmény nélküli beavatkozást követően másnap elhagyhatja kórházunkat.