




BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A cytologiai és/vagy kolposzkópos eltérés miatt végzett beavatkozásról

Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.



Önnél az elvégzett vizsgálatok olyan eredménnyel zárultak, amelyek további kivizsgálása a méhnyakról történő szövettelt tesz szükségessé. A méhnyakról származó sejtek mikroszkópos vizsgálata megtörtént, ami felveti ezen a területen a sejtek kóros burjánzásának lehetőségét. Mivel a cytologiai vizsgálattal az elváltozás szövettani háttere és kiterjedése nem ítélnél meg, betegségének pontos tisztázása érdekében a méhnyak hüvelyi részéről történő anyagvételt ajánlunk. A műtét lényege a méhnyakon lévő gyanús/kóros rész eltávolítása.

Előzetesen elvégzett laborvizsgálatok után a műtét napján reggel 6³⁰-kor történik a felvétel a nőgyógyászati osztályon. Ha rendszeresen szed gyógyszereket kérjük, hogy azokat a kora reggeli órákban egy korty vízzel vegye be. A beavatkozást rövid altatásban végezzük. Hámelváltozás esetén a méhnyak hüvelyi részének körkörös kúpszerű kimetszése történik (konizáció) melyet a visszamaradt méhnyak és a méhtest nyálkahártyájának kikaparásával egészítünk ki (diagnosztikus méhkaparás).

Esetenként szükségessé válhat a méhnyak teljes eltávolítása. A műtét a későbbi terhesség kiviselését nem zavarja. Az ilyen típusú műtéteket a hagyományos technika mellett újabban elektromos hurokkal (loop) is végezzük. A további teendők tekintetében a szövettani vizsgálat eredménye irányadó. Korai szövődményként utóvérzés jelentkezhet, melyet kis beavatkozással el tudunk háritani. Nagyon ritkán a méh eltávolítása segít csak a probléma megoldásában. Hidegkéssel történő beavatkozás után előfordulhat a méhszáj szűkülete, ami esetleg megzavarhatja a menstruációs váladék kiürülését.

A jelzett korai és késői szövődmények a leggondosabb műtéti technika és tapasztalat mellett is előfordulhatnak. A műtét után szükséges megfigyelés alatt általában a korai szövődmények kiderülnek és van lehetőségünk elhárítani azokat. Szövődmény nélküli beavatkozást követően másnap elhagyhatja kórházunkat.