





BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A terhesség megszakításáról

Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Jelen döntését bizonyára hosszas töprengés előzte meg. Mindenek előtt tájékoztatjuk, hogy döntésével a születésszabályozás nem kívánatos módját választotta. Előzetesen elvégzett laborvizsgálatok után a műtét napján reggel 7³⁰-kor éhgyomorral történik a felvétel a nőgyógyászati ambulancián. Ha rendszeresen szed gyógyszereket kérjük, hogy azokat a kora reggeli órákban egy korty vízzel vegye be. A beavatkozást rövid altatásban végezzük.



A műtét lényege, hogy a méhszáj kitégítése után a terhességet szívókészülékkel és egyéb műszerekkel eltávolítjuk a méhürből. Szült nőknél a tágítást fél mm-ként vastagodó steril fém hengersorral (Hegar-eszköz) végezzük. Nem szült nők esetében a méhszáj előzetes kitégítését gyógyszerekkel vagy steril duzzadó anyaggal (laminaria) érjük el. A kórházi felvétel napján felhelyezzük a méhnyak tágító anyagot, majd csak bizonyos elteltével ürítjük ki a terhes méhet. A műtétet újabb 24 órás megfigyelés követi a hazabocsátás előtt.

Ha terhesség nagysága a 12. hetet meghaladta, minden esetben gyógyszeres méhszájtágítást végzünk, majd méhösszehúzókat tartalmazó infúzióval fájásokat keltünk és a spontán lefolyásra várunk. A méhszáj kitégítése órákat, sőt napokat is igényelhet. A vetélés két szakaszban lezajlik, majd küretkanállal méhüri betapintást végzünk.

Az esetek kis részében szövődményként előfordulhat peterész visszamaradás, a műszerek okozta sérülés, utóvérzés, gyulladás, amely másodlagosan meddőséghez vezethet. Olykor ezek megoldása további teendőket igényelhet, melyek a kórházi kezelés idejét megnyújthatják. (Pl. gyógyszeres kezelés, a műtét kiterjesztése, esetleg hasi műtét végzése, vérzéscsillapító eljárások alkalmazása, mint pl. tamponálás, vérpótlás). A jelzett szövődmények a leggondosabb műtėti technika és tapasztalat mellett is előfordulhatnak. A műtét után szükséges megfigyelés alatt általában ezek a szövődmények kiderülnek és van lehetőségünk elhárítani azokat. Szövődmény nélküli beavatkozást követően másnap elhagyhatja kórházunkat.