



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A terhességi hányásról

Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A terhesek közel fél százalékában alakul ki a táplálkozástól független gyakori vagy folyamatos kóros hányás (hyperemesis gravidarum). Az esetek döntő többségében lelki talajon kialakuló testi megbetegedésnek tartjuk.

Jellemző tünetei a jelentős testsúlycsökkenés, a kiszáradás, a gyengeség. A folyadék-, ion-, valamint tápanyaghiány következtében a sav-bázis háztartás zavara, hőemelkedés, esetleg láz, sárgaság, sőt kóma fejlődhet ki, továbbá a máj- és a veseműködés zavara léphet fel.

A betegnek feltétlenül kórházi kezelésre van szüksége. A kezelésben a pszichoterápián kívül a folyadék- és ionháztartás rendezésének van döntő szerepe. Naponta 3000 ml infúzió (só, cukor, vitamin, aminosavak) adása néhány nap alatt rendezheti a beteg állapotát. B6 vitamin adása kedvező hatású lehet. A beteget néhány napos panaszmentes állapot, a testsúlygyarapodás megindulása után, megnyugtató szájon keresztül történő táplálkozás mellett hazabocsátjuk. Igen ritka esetben a hetekig tartó hányás gyógyszeres kezelésre nem szűnik meg és csak a terhesség megszakítása segít az életveszélyessé váló állapot visszafordításában.