



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Az abbamaradt vetelésről

**Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!**

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Abbamaradt vetelés (missed abortion). Erről akkor beszélünk, ha a korai terhesség elhalása után a vetelés nem következik be. Az elhalás oka többnyire nem állapítható meg. Kevés barnás jellegű vérzés jellemzi. A terhesség gyanújelei megszűnnek, fémess szájíz jelentkezik. Középidős terhességben a magzatmozgás megszűnik.

Az ultrahangvizsgálat megbízhatóan igazolja a körképet. A hosszabb ideje fennálló missed abortion esetében a felszabaduló véralvadást aktiváló anyagok véralvadás zavar kialakulását idézhetik elő, főként a második harmadban. Tekintettel arra, hogy a vetelés törvényszerűen bekövetkezik, melynek sem a pontos ideje, sem a vérvesztés mértéke nem jósolható meg, a terhesnek felajánljuk a terhesség befejezését.

#### **Kezelés**

Ha többször szült nőről van szó fél milliméterenként vastagodó hengersonal kitágítjuk a méhszájat, majd szívókészülék segítségével kiürítjük a méhet 12. hét alatt. Nem szült nőknél a méhszáj, megfelelő gyógyszeres érlelése vagy duzzadó anyaggal történő előtágítása után a 12. hétnél fiatalabb terhesség esetén a méhet vacuum szívókészülékkel ürítjük ki. A nagyobb terhesség esetében gyógyszeres méhnyakérlelés után intravénásan adott oxytocinos infúzióval keltünk fájástevékenységet. A vetelés lezajlása után méhúri műszeres befejezést végzünk. A beavatkozást rövid altatásban végezzük. Az eltávolított anyagot szövettani elemzésre küldjük. A végleges eredmény a szövettani vizsgálat elvégzése után áll rendelkezésünkre. Ekkor tehetünk pontos javaslatot a további gyógykezelésre.

A nagyfokú vérvesztés miatt alkalmanként vérátömlesztésre is szükség lehet. Rh negatív vércsoport esetén, a beavatkozás után 72 órán belül védőoltást adunk. Az esetek kis részében szövődményként számolnia kell a műszerek okozta sérüléssel, nem várt vérzés, gyulladás alakulhat ki. Olykor ezek megoldása további teendőket igényelhet, melyek a kórházi kezelés idejét megnyújthatják. (Pl. gyógyszeres kezelés, a műtét kiterjesztése, esetleg hasi műtét végzése, vérzéscsillapító eljárások alkalmazása, mint pl. tamponálás, vérpótlás).

