



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A méhnyak fertőzéseiről

Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szoba jöhető szövődményekről.

A méhnyak a nemi szervek alsó és felső részének határán helyezkedik el. Saját baktériumflórával nem rendelkezik. Helyzeténél fogva részt vesz a nemi életben, ilyenkor közvetlen kapcsolatba lép a potenciálisan fertőzést hordozó férfi húgycsővel. A méhnyak fertőzései csaknem minden esetben nemi érintkezés következtében alakulnak ki. A szoba jövő kórokozók a méhnyak csatorna hengerhámját támadó baktériumok (*Neisseria gonorrhoea*, *Chlamydia trachomatis*), valamint a méhnyak hüvelyi részét borító laphámot károsító vírusok (*Herpes simplex vírus /HSV/*, Humán papilloma vírus /HPV).

A herpesvírus a külső nemi szervek fertőzésének részjelenségeként okoznak hólyagképződéssel járó elváltozást. A méhnyak HPV fertőzése igen ritkán fordul elő önállóan. Legtöbbször egyéb fertőzésekhez társul. Tünetet nem okoznak. A vírus egyes alfajai mai tudásunk szerint szerepet játszanak a méhnyakrák kialakulásában. A vírusfertőzés felismerése a rendszeres szűrővizsgálattal és kiegészítő mikrobiológiai vizsgálattal lehetséges. A kezelés során a gyógyszerek szedése mellett a rendszeres ellenőrzés a legfontosabb. Ha a kontroll vizsgálatok a méhnyak kóros citológiai eredményét igazolják, sor kerülhet a méhszájról történő szövettani anyagvétele a folyamat tisztázása céljából. A további teendőket ennek eredménye alapján egyedileg határozzuk meg.

A méhnyak csatorna fertőzése az esetek egy részében bővebb nyákos gennyes folyással máskor teljesen tünetmentesen zajlik. Ha a húgycső is fertőződik esetleg vizelési panaszok jelentkeznek. Heveny fertőzés esetén a mérsékelten megsaporodott rendellenes folyás hívhatja fel a figyelmet a méhnyak gyulladás lehetőségére. Gyakran jár együtt a hüvely bakteriális és *Trichomonas vaginalis* okozta gyulladásával. A fertőzés a nemi szervrendszer felső részébe terjedhet, azok gyulladását okozva. Késői szövődményként meddőség, méhen kívüli terhesség, állandósult hasi fájdalom léphet fel.

A rendelkezésre álló mikrobiológiai vizsgálatokkal a kóreredit kideríthető. Kezelésre antibiotikumokat adunk.

Ha nem történik megfelelő kezelés a fentebb említett szövődmények mellett a méhnyak elhúzódó gyulladása alakul ki. Kialakulását elősegíti a szülési méhnyak repedés. A tünetek között a legfontosabb a méhnyak felől jelentkező változó eredetű folyás. Időnként előfordulhat a gyulladt méhnyakból vérezgetés is. Nőgyógyászati vizsgálat tisztázhatja a folyamat eredetét. A mikrobiológiai leletnek megfelelően antibiotikus kezelést adunk. Sokszor a túrhetetlen panaszokat csak a méhszáj műtéti helyreállításával tudjuk megszüntetni.