



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### A szeméremtest és a hüvely gyulladásairól

**Tisztelt Hölgyem! Kedves Betegünk!**

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A női nemi szervek gyulladása alapvetően két módon alakulhat ki. Egyik esetben az érintett szervben tünetmentesen jelenlévő baktériumflóra tagjai indulnak szaporodásnak, majd amikor elérnek egy kritikus koncentrációt, klinikai tüneteket okoznak. Másik forma, amikor a külvilágból jut a nemi szervekbe a kórokozó ágens és elszaporodása után tüneteket okoz. A fertőzések kiváltásában baktériumok, vírusok és gombák, és egysejtű lények játszanak szerepet. A fertőzések súlyosságát és a szövődményeket tekintve alsó és felső csoportra osztjuk a nemi szerveket. A két rész közötti határnak a méhnyak tekinthető.

Szeméremtest és hüvelyi fertőzések. Az alsó nemi szervrendszer leggyakoribb gyulladással járó betegségei általában a hüvelyt és a szeméremtestet is érintik. Leggyakrabban, baktériumok, gombák, és a Trichomonas vaginalisnak nevezett egysejtű játszának szerepet a fertőzések kialakulásában. Ezen kívül az életmód, a táplálkozás, a helytelen higiénés szokások, halmozott közösülés, gyakori partnerváltás, bizonyos betegségek, valamint egyes gyógyszerek szedése, mint kockázati tényezők szerepet játszanak a kórképek kialakulásában. Jellegzetes folyás, altesti viszketés, diszkomfort érzés, közösülési nehézségek, vizelet zavarok hívják fel a figyelmet a fertőzés jelenlétére. A bakteriális és gombás folyás esetén a nemi szervekben normálisan kis számban jelenlévő kórokozók szaporodnak el, és váltanak ki jellegzetes tüneteket. A Trichomonas vaginalis fertőzés oka leggyakrabban a fertőzött partner. A kóreredet nőgyógyászati vizsgálattal kideríthető, és ennek alapján a célzott kezelés biztosított. A gyógyszeres kezeléssel a tünetek néhány nap alatt megszűnnek. Mivel a hajlamosító tényezők az életmóddal szorosan összefüggnek, a kórkép kiújulására esetenként számítani lehet.

Önmagában nem súlyos betegségekről van szó, de lehetséges következményeit tekintve komoly népegészségügyi jelentőséggel bírnak. Kezeletlen esetben a fertőzések tovább terjednek a nemi szervek felsőbb részeire, és azok gyulladását okozva esetleg életet veszélyeztető akut hasi állapot is kialakulhat. Késői szövődményként petevezető elzáródás okozta meddőséggel is számolni kell. Terheseknél a magzatburok és a magzat fertőzését előidézve, vetélést koraszülést okozhatnak.