



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Légúti allergia, allergiás nátha

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Meghatározás:

Az allergiás nátha az orrnyálkahártya és a felső légutak nyálkahártyájának nem fertőzőes eredetű gyulladása, mely különböző környezeti ágensek= allergének által okozottan alakul ki. A gyulladást az allergénekkal szemben termelődött specifikus ellenanyagok közvetítik.

A betegség tünetei:

orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, orr és torokviszketés, szemtünetek: könnyezés, viszketés.

A betegség diagnosztikája:

In vivo teszt: Prick teszt, mely a legalkalmasabb az IgE típusú allergének tesztelésére, ennek során a feltételezett allergénekből egy-egy cseppet az alkar hajlító oldalára cseppentünk, majd ezeken a helyeken egy speciális lándzsával sterilen az allergéneket a bőr felszíne alá juttatjuk, majd az erre a vizsgálatra adott reakciót 15-20 perc múlva leolvassuk.

A vizsgálat elvégzésébe írásos beleegyezés szükséges !

Az allergiás bőrpróba orvos jelenlétében, vagy azonnali elérhetőségének biztosítása esetén végezhető, kérjük, amennyiben a megfigyelési idő alatt bármilyen rendellenességet észlel a vizsgálat előtti állapotához képest azonnal értesítse a személyzetet. Ugyanakkor tudni kell, hogy a bőrpróba során kialakuló egész szervezetet érintő szövődmények rendkívül ritkák. Fokozott óvatosság ajánlott azonban a vizsgálat idején heves orrtüneteket vagy asztmás tüneteket mutató betegek esetén.

In vitro vizsgálat, mely a vérből laboratóriumi vizsgálat után mutatja ki a különböző allergének ellen termelődő ellenanyagokat.

A betegség kezelése:

részben az allergének elkerülése, részben a tüneteket enyhítő gyógyszeres terápia, mely lehet szájon át szedendő tabletta és/vagy helyileg alkalmazott orrspray és /vagy szemcsepp