



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Prosztatagyulladásos betegek részére

Tisztelt Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Ma sem teljesen ismert, hogyan alakul ki a prosztatagyulladás. Minden esetben több tényezőnek tulajdonítanak szerepet, ezek a fertőzés, bizonyos hormonális faktorok és a mindennapi stressz.

**A prosztatagyulladásnak számos tünete van, ezért tüneteinek rendkívül változatosak.**

Az úgynevezett bakteriális prosztatagyulladások esetében a prosztatát váladékában kimutatható a kórokozó. A váladékot prosztata masszázsa révén nyerjük. Az esetek mintegy kétharmadában azonban nem mutatható ki baktérium vagy egyéb kórokozó. Meg kell jegyezni, hogy a kórokozó alatt nem csak a baktériumokat, hanem az úgynevezett mikroplazma, chlamidia és gombafajokat is értjük.

**A fenti tényezőket figyelembe véve a prosztatagyulladásnak a következő fajtáit ismertetjük:**

#### **1.) Heveny, bakteriális prosztatagyulladás**

Ezt a lázzal járó, néha vizeletelési nehézségeket okozó, egyértelműen baktérium okozta gyulladást a legkönnyebb diagnosztizálni. A betegség meggyógyítható hosszan tartó antibiotikum kezeléssel.

#### **2.) Krónikus, bakteriális prosztatagyulladás**

A tünetek kevésbé kifejezettek, mint a heveny prosztatagyulladásnál. A panaszok diffuzak, alhasi, gáttáji fájdalom, vizeletelési nehézség, a potenciazavarok mind előfordulhatnak. Ebben az esetben is a prosztatát váladékából, illetve az ondóból, vagy mindkettőből tenyésztethető ki a kórokozó.

A betegség hosszantartó gyulladásgátló szerekkel kezelhető, meggyógyítható. Mindig figyelembe kell venni az esetleges társbetegségeket, a húgycső szűkületet, a prosztatát megnagyobbodását, vagy az olyan rendszerbetegségeket, mint például a cukorbetegség.

**3.) A gyulladáshoz eredetű, idült kismencedeai fájdalom szindróma** alatt értjük azt a betegséget, amelynek tüneteinek a krónikus bakteriális prosztatagyulladásnál felsoroltuk, de baktériumot nem sikerült kitenyészteni.

**4.) A nem gyulladáshoz eredetű kismencedeai fájdalom szindróma** esetében nem is a prosztatát beteg, hanem a prosztatát környéki szövetek, a hólyagnyaki, a medencefenéki izomrostok görcskészsége fokozott. Ez a fokozott feszülés különböző növényi kivonatokkal és fizioterápiával gyógyítható.

#### **5.) A tünetmentes prosztatagyulladás**

Olyan gyulladás a prosztatában, amely nem okoz panaszt. Gyakran meddő házaspároknál vagy a prosztataműtétek feldolgozása során derül rá fény. Mindenképpen ki kell mutatni a kórokozót, ezt követően hosszantartó antibiotikum kezelést végezve, el kell pusztítani a baktériumokat.