



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Hereműtetre kerülő betegek részére

**Tisztelt Uram! Kedves Betegünk!**

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A here kb. szilva nagyságú, lelapított szerv, mely a hasfal rétegeiből keletkezett burkoltól körülvéve a herezacskóban foglal helyet. A mellékhere félhold alakban öleli körül a here hátsó részét.

A hereműtétek végezhetőek lágyéktáji vagy herezacskón áthatoló metszéssel keresztül megfelelő bőrfertőtlenítés után. A herezacskón végzett műtéteknél a vérzésveszély kifejezettebb.

Érzéstelenítés:

Lehetséges helyi - infiltrációs,  
vezetékes - gerincvelői, vagy  
általános - altatásos

A here műtétek lényege, hogy a here körüli kóros elváltozást megszüntesse, vagy a herében kialakult kóros elváltozások eltávolítása megtörténjen, szükség esetén a herével együtt.

Rosszindulatú elváltozás esetén a herét magasan a sérvcsatorna felső részében függelékével együtt kell eltávolítani.

Leggyakoribb herekörüli elváltozás az úgynevezett vízsérv, amikor a here körül folyadékkal telt tömlő alakul ki. Lehetséges a megszüntetése a tömlő kifordításával vagy a tömlő nagy részének kiirtásával.

A here érintetlen marad, rövid bőrmetszés szükséges, a gyógyulás gyors. Műtét után ajánlatos heretartó vagy száratlan alsónadrág viselése.

Herevisszértágulat: amikor a here körül tágult vénahálózat alakul ki, mely a here sorvadásához, fájdalomhoz vezethet. Legtöbbször elegendő az egyesülő visszérnek lekötése a lágyékcsontról.

Rövid bőrmetszés, gyors gyógyulás és felépülés.

15-35 éves kor között gyakoribb a here rosszindulatú daganata, mely esetben a herét függelékével együtt magasan a lágyékcsontról kell eltávolítani. A teljes gyógyulás érdekében szükség lehet gyógyszeres, további műtéti (nyirokcsomó eltávolítás) és sugárkezelésre. A teljes gyógyulás igen magas százalékban bekövetkezik.

Sérült, csavarodott here esetében a műtét a here megtartására irányul. Fontos, hogy a műtét időben történjen.

Szövődmények közül leggyakoribb a vérzés, a sebek gennyedése. Ezért fontos a hereműtét előtt az alapos szappanos mosakodás, műtét után a sebkörnyezet tisztántartása és a megfelelő mozgás.