



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Görcsös hasi fájdalom (Colica Abdominalis)

#### Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz melyet az ön gyermekén tervezünk, szükséges az ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni, ill. ezúton tájékoztatni a gyermeke valószínűsíthető betegségéről, valamint a beavatkozások módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A hasfájás a hasi szervek betegségére és/vagy működési zavarára utal. A vizsgálatok a hasfájás heveny, vagy elhúzódó egyre fokozódó, vagy visszatérő jellegétől, helyétől, intenzitásától, a társuló panaszoktól és tünetektől függően történnek. Ez magában foglalja a beteg általános orvosi vizsgálatát (beleértve a végbélvizsgálatot is, mely a vizsgáló személy gumikesztyűs ujjával történő végbél áttapintást jelenti), vérép-, vizelet-, székletvizsgálat (vérteszt, emésztettség, féregpete, baktérium, vírusvizsgálat), táplálékallergia -, ill. tejcukor érzékenység kizárása, hasi ultrahang, szükség esetén hasi röntgenvizsgálat, sebészeti konzultáció. Amennyiben a hasi panaszok mögött szervi eredet nem bizonyítható, bizonyos esetekben pszichológiai feltárás is szükséges.

A szükséges terápia: az esetek legnagyobb részében fertőzőes eredetű gyomor-bél hurutról van szó, ilyenkor tüneti kezelést, fájdalomcsillapítást, ill. a folyadékpótlás különböző formáit alkalmazzuk (szájon keresztül, vagy vénás úton), ritkábban antibiotikum adása is szükséges lehet. Oki kezelést igénylő kórképek vizsgálata (a féregnyúlvány, hasi nyirokcsomók-, hashártya-, hasnyálmirigy-, gyulladása, hasi szerv sérülése, bélösszecsúsás, bélelzáródás, húgyút fertőzés, székrekedés, tejcukor érzékenység, petefészek, petevezeték, ill. a méh kóros állapotai), melyek igazolódása esetén célzott terápiát indítunk.

Amennyiben szervi ok kizárható: csecsemők esetén szoptatási -, táplálási tanácsok, megfelelő fektetés, görcsoldó-fájdalomcsillapító, székletlazító gyógyszerelés alkalmazható.

A kivizsgálás és a megfelelő kezelés beállítása a kóroktól függően átlagosan 3-25 napot vehet igénybe. Az alkalmazott kezelés lehetséges szövődményei: vérvétel, ill. vénás úton történő folyadékpótlás esetén bőr alatti vérömleny alakulhat ki, a vénás úton történő folyadékadásnál pedig a legnagyobb gondosság mellett is előfordul a folyadék szövetközi térbe való áramlása duzzanat kialakulása. A beadott gyógyszerek esetén allergiás reakcióval kell számolni, sebészeti beavatkozás szükségessége esetén a sebész ad tájékoztatást.

A megfelelő kezelés elmaradása esetén a kiváltó októl függően súlyosbodhatnak a panaszok, szövődmények alakulhatnak ki (hányás, kiszáradás, üreges hasi szervek átfürödése, vérmérgezés, hiányállapotok, gyarapodási zavar, vérszegénység).