



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Fulladásos hörghurut (Obstruktív Bronchitis)

Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz, melyet gyermekükön tervezünk, szükséges az Önök beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjanak az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségükre lenni gyermekük betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és szóba jöhető szövődményekről.

A fulladásos hörghurut csecsemő-, és kisded korban leggyakrabban vírusfertőzés vagy tehéntej fehérje allergia által kiváltott, gyógyszeresen oldható hörgőszűkület. A hörgő szűkület fokától, egyéni adottságoktól és az esetleges szövődeményektől függően általában 4-10 napos kórházi ellátást igényel. Tünetei: hangos, sípoló légzés, a kilégzés megnyúltsága, esetleg orrszárnai légzés, a légzési segédizmok használata, bőrszín romlása.

A gyermek kivizsgálása során vérvétel, orr-, torokváladék-tenyésztés, vizeletvizsgálat, fül-orr-gégészeti vizsgálat, tüdőgyulladás gyanúja esetén mellkasröntgen készítése válhat szükségessé.

A tervezett terápia: nyákoldó és hörgőtágító ill. gyulladáscsökkentő adása szirup, tableta, kúp, géppel porlasztott aerosol formájában, orrszívás, orrcseppezés. Bakteriális felülfertőződés gyanúja vagy igazolódása esetén antibiotikum adása indokolt: szirup, tableta, izomba vagy vénába adható injekció formájában. Szükség esetén lázcsillapítás.

Kifejezett nehézlégzés, romló vérgáz értékek esetén fejbúrán vagy orrszondán át áramló oxigén adása, esetleg légcső becsövezés és gépi lélegeztetés is szükségessé válhat, folyamatos szívritmus és véroxigén telítettség monitorozás mellett.

Vénabiztosítás és fokozódó nyugtalanság esetén a végtagok rögzítésére és enyhe nyugtatásra is szükség lehet. A gyermek táplálása a megszokottnál gyakrabban és kisebb mennyiségekkel történik, bő, szénsavmentes folyadék fogyasztása kívánatos, hányás esetén infúziós táplálásra térünk át.

A megfelelő kezelés elmaradása esetén a hörgőgörcs légzési elégtelenséghez, fulladáshoz, ill. a szövődmények gyakoribbá válásához vezethet.

A szükséges terápia alkalmazása mellett is kialakulhat azonban szövődményként középfülgyulladás, tüdőgyulladás, hányás és kiszáradás, hasmenés.