



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Gastro-oesophagealis reflux

Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz melyet az ön gyermekén tervezünk, szükséges az ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni, ill. ezúton tájékoztatni a gyermeke valószínűsíthető betegségéről, valamint a beavatkozások módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A fenti megnevezés egy olyan gyermek – és felnőttkorban egyaránt előforduló elváltozást takar, melynek lényege a savas gyomortartalom nyelőcsőbe való visszaáramlása, oka a nyelőcső alsó részén található záró izomzat éretlen vagy elégtelen működése. Ennek következtében a nyelőcső, garat-, valamint szájüreg nyálkahártyájának izgalma, sérülése, gyulladása alakulhat ki. Tünetei változatosak: hányinger, hányás, melyet sok esetben öklendezés nem előz meg, étvágytalanság, vérszegénység, fájdalmas nyelés, súlygyarapodási zavar, légúti tünetek pl.: ismétlődő hörghurut, átmeneti légzésleállás.

Kivizsgálása során a kórkép fennállását próbáljuk kimutatni, ebből a célból hasi ultrahang-, kontrasztanyag nyeletéses röntgenvizsgálat, a 24 órás nyelőcső pH meghatározás (vékony, mérésre alkalmas cső nyelőcsőbe való levezetése), nyelőcső-, ill. gyomortükrözés valamint vérvizsgálatok jönnek szóba. Fontos hangsúlyozni, hogy a reflux normális esetben is kialakul, ill. egyes életkorokban bizonyos keretek közt nem tekinthető kórosnak (újszülöttek, fiatal csecsemők).

Szövődménymentes esetben a terápia 30 fokos lejtőn, éber állapotban hason való pozicionálásból, életkorának, testsúlyának megfelelő gyakoriságú és mennyiségű táplálék alkalmazása sűrítése, szükség esetén a gyomor felső záróizom tónusának, valamint a gyomor ürülésének gyógyszeres fokozása jön szóba (3 héten át) a hiányzó vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, szénhidrátok pótlása mellett.

A kivizsgálás és a megfelelő terápia beállítása kóroktól függően változó, 3 – 30 napot vehet igénybe. Szövődményes esetekben gyomorsavcsökkentő gyógyszerek adása anatómiai eltérés esetében korrekciós műtét is szóba jön.

A megfelelő kivizsgálás és kezelés elmaradása esetén a fentiekben részletezett szövődmények kialakulása valószínűsíthető (légúti tünetek, súlygyarapodási zavar, átmeneti légzésleállás stb.)