



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Agyhártyaizgalmi tünetek (Meningizmus)

#### Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz, amelyet az Önök gyermekén tervezünk, szükséges az Önök beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjanak, az alábbi tájékoztatással szeretnénk a segítségükre lenni, amelyben a gyermek betegségéről, a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről nyújtunk felvilágosítást.

**Agyhártyaizgalmi tüneteket** gyermekkorban sokféle betegség okozhat.

Elsősorban központi idegrendszert érintő betegségek: vírusos, bakteriális, gombás, parazitás fertőzések által okozott gyulladások (agyhártya-, agyvelő-, gerincvelő gyulladás, tályog), koponyaúri vérzések, daganatok.

Sérülések.

Gennyes középfül és csecсныúlvány gyulladás.

Általános betegségek: torokgyulladás, garatmandulák körüli tályog, tüdőgyulladás, izom-izületi fájdalom, gyulladás, nyaki csigolyák betegségei, agyi bénulás, kiszáradás.

Mérgezők, enzimbetegségek, autoimmun betegségek, hematológiai betegségek.

Jóindulatú agynyomás fokozódás.

**Tünetek:** Csecsemőkorban hirtelen hányások, magas hangú sírás, nagykutacs elődomborodása.

Gyermekkorban fejfájás, fénykerülés, hányás, tarkókööttség. (Fejét fekvő helyzetben előreahajtva térdeit felhúzza, oldalán fekszik felhúzott térdekkel, lábait nyújtva nem tudja felemelni.)

A kiváltó októl függően általában 3-10 napos kórházi ellátás szükséges.

A **kivizsgálás** során vérvétel, vizelet vizsgálat, váladékminták tenyésztése, szakkonziliumok (szemészet, fül-orr-gégészet, neurológia) válhatnak szükségessé, képalkotó vizsgálatokra (ultrahang, CT, MR) kerülhet sor és lumbálpunkció során agyvíz vizsgálatra.

**Kezelés** a kiváltó októl függően infúzió, agynyomáscsökkentő szer adása, bakteriális gyulladás esetén antibiotikum vénásan, izomba, esetleg szájon át adva, lázcsillapítás, a vérgáz értékek, szívritmus, vérnyomás ellenőrzése mellett. Szükség lehet a gyermek nyugtatására is. A táplálás a megszokottnál kisebb adagokban, gyakrabban történik.

**Szövődményként** fokozódhatnak a tünetek, hányás, láz, görcs, tudatállapot romlása.

**Kezelés elmaradása** esetén keringési, légzési elégtelenség, görcs, maradandó idegrendszeri károsodás, beékelődés, halál is bekövetkezhet.