



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### Vérlemezkeszám- csökkenés (Thrombocytopenia)

#### Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz melyet az ön gyermekén tervezünk, szükséges az ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni, ill. ezúton tájékoztatni a gyermeke valószínűsíthető betegségéről, valamint a beavatkozások módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A vérlemezkek a vérsejtekhez hasonló alakot mutató, vérzés csillapításában, ill. a vérrög képződésében kulcsszerepet játszó elemei, termelődésük a csontvelőben történik. Számuk csökkenése sok betegség kísérő tünete lehet, ezen kívül ismeretesek a csak a vérlemezkéket érintő veleszületett, vagy szerzett megbetegedések. Amennyiben a csökkenés egy kritikus szintet elér, mely azonban számszerűleg pontosan nem adható meg, az ok nélkül, ill. kisebb sérülés következtében fellépő, adott esetben aránytalanul nagymértékű vérzések esélye megnő. A vérlemezkeszám csökkenés következtében jellegzetes módon elszórtan pontszerű bőr- és nyálkahártyavérzések alakulhatnak ki, de belszeri vérzés (bélrendszer, tüdő, agy, vese) is elképzelhető, melynek tünetei igen változatosak lehetnek.

Az eltérés sok betegség következménye lehet, gyermekkorban elsősorban különböző súlyosságú fertőzések, gyógyszer mellékhatás, ill. az immunrendszer megbetegedései által okozott kóros állapotok állnak a háttérben, ritkább esetekben rosszindulatú, rákos megbetegedések (leukaemia – fehérvérűség) kísérő jelensége lehet.

A kivizsgálás során a kiváltó ok tisztázása történik, melyhez a kórelőzmény részletes kikérdezése (gyógyszerszedés), vér- és képalkotó vizsgálatok, szakorvosi konzíliumok, a feltételezett fertőzést okozó kórokozók közvetlen, vagy közvetett kimutatása (vérből, vizeletből, különböző váladékokból), szükség esetén centrumokban csontvelővizsgálat történik.

A kezelés a talált kóroktól függ, mely magában foglalja a kiváltó fertőzés kezelését, ill. gyógyszer elhagyását, az immunrendszer megbetegedése esetén gyógyszeres terápia, mely a kóros reakció elnyomásán alapul. Rosszindulatú, rákos megbetegedés esetén az ennek megfelelő (citosztatikus) kezelés megkezdése történik.

A terápia következményeként kialakuló mellékhatások sokrétűek, ezek ismertetése konkrét esetben a kezelőorvos feladata. Kezelés nélkül az alapbetegség előrehaladása, ill. a vérzékenységi hajlam miatt életveszélyes vérzés is kialakulhat. Amennyiben a vérlemezkeszám- csökkenés nem átmeneti, azaz tartósan fenn fog állni, javasolt a sérülésektől való fokozott védelem.