



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Eszméletvesztéses, görcsös roszullét

Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz, amelyet az Önök gyermekén tervezünk, szükséges az Önök beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjanak, az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segítségére lenni gyermeke betegségéről, a szükséges beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Eszméletvesztéses, görcsös roszullét okai lehetnek:

- bármilyen eredetű lázas állapot,
- heveny vírus, baktérium által okozott fertőzés,
- a központi idegrendszer gyulladása, sérülése, daganata, koponyán belüli vérzés, szélütés,
- a szervezet anyagcsere egyensúlyának megváltozása (vércukor, kalcium, magnézium),
- szívbetegség, légzőrendszeri betegség,
- mérgezés (gyógyszerek, növényi részek, állati mérgek, toxikus anyagok, gázok)
- epilepszia,
- napszúrás

Vizsgálatok:

Fizikális vizsgálaton kívül vérvétel, vizelet vizsgálat, vitális funkciók ellenőrzése, szükség esetén gyomormosás, lumbál punkcióval agyvíz mintavétel, képalkotó vizsgálatok (ultrahang, CT, MR), szakkonzíliumok igénybevétele (szemészet, infektológia, neurológia).

Kezelés:

A görcsös állapot megszüntetése intravénás, izomba, vagy végbélbe történő gyógyszer adásával, az agyduzzadás csökkentése, láz csillapítása a megfelelő gyógyszerekkel, a kiváltó ok kezelése.

Légzés, keringés támogatás, anyagcserezavar rendezése infúziós folyadékpótlással és az ionegyensúly helyreállításával, szükség esetén oxigén adása. Vércukor normalizálása. Gennyes gyulladás esetén antibiotikum, vírusfertőzésnél vírusellenes szerek adása. Mérgezéskor ellenszer adás.

Rendkívül súlyos esetben gépi lélegeztetés válhat szükségessé izomlazítással, altatással.

A görcsös állapot potenciálisan életveszélyt jelent!

Görcsölő beteget oldalára kell fordítani, fejét óvni kell a sérüléstől, szájába fakanalat, egyéb kemény tárgyat dugni TILOS!