



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Lumbálpunkció (gerinccsapolás)

Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz, amelyet az Önök gyermekén tervezünk, szükséges az Önök beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjanak, az alábbi ismertetéssel szeretnénk a segítségükre lenni.

A lumbálpunkció lényege: Agyvizet tudunk nyerni vizsgálat céljából.

Kivitelezése: Helyi fertőtlenítést követően steril körülmények között a gerinc deréki szakaszának két alsó csigolyája között tűt vezetünk a gerincburok közé, amelyen keresztül néhány ml agyvizet engedünk le kémcsőbe. A vizsgálathoz a gyermek fájdalomcsillapítót, szükség esetén bódító gyógyszert kap.

A vizsgálat a következő betegségek gyanúja esetén szükséges:

- Különböző eredetű (vírusos, bakteriális, parazitás, gombás, illetve fertőző ok nélküli) központi idegrendszeri gyulladásos betegségek (agyhártya, agyvelő, gerincvelő gyulladásai),
- Eszméletlenség, tudatzavar,
- Agyhártyához közeli folyamatok (fertőzések, tályogok, daganatok),
- Lágyagyhártya alatti vérzés,
- Idegpályák elfajulásával járó kórképek, ideggyökök gyulladásos elváltozásai,
- Agyhártyák daganatos áttéte, daganatok kiváltotta idegrendszeri tünetek,
- Jóindulatú agynyomásfokozódás gyanúja,
- Fertőzéses agyi érrögösödés,
- Májbetegségekhez, autoimmun betegségekhez, mérgezésekhez társuló agyi működészavar,
- Lázas görcsroham 1 éves kor alatt, afölött abban az esetben, ha agyhártyagyulladás lehetősége felmerül,
- Vérmérgezés 1 éves kor alatt, afölött központi idegrendszeri érintettség tünetei esetén,
- Központi idegrendszeri tünetekkel járó degeneratív és anyagcsere betegségek esetén.

Lehetséges szövődmények:

Nem sikerül agyvizet nyerni, a szúrás eret ér, ezáltal az agyvíz véressé válik, befertőződhet a szúrás nyomán, agyvíz szivárgás következhet be, sérülhet ideggyök (fájdalom, zsibbadásérzés), cysta keletkezhet, néhány napig fejfájás előfordulhat (főleg nagyobb gyermekeknél, akik nem fekszenek a lumbálpunkció után), beékelődés.

A lumbálpunkció elmaradása miatt bekövetkező lehetséges szövődmények:

A megfelelő kezelés késleltetése, gyulladás esetén annak fokozódása, tályogképződés, görcsölés, maradandó idegrendszeri károsodás, vakság, sükettség, keringési-légzési elégtelenség, beékelődés, halál.

A vizsgálatot követően 24 órán keresztül feküdni szükséges a fejfájás és egyéb szövődmények elkerülése érdekében!