



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Pszichotikus zavarban szenvedő betegek részére

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Önt azért vettük fel osztályunkra, mert panaszainak és tüneteinek oka jórészt lelki eredetű. Ön jelenleg meglehetősen súlyos pszichés állapotban került kórházba, feltehető, hogy pszichiátriai betegségben - pszichotikus zavarban - szenved.

Erre jellemző lehet, hogy az egyén alkalmazkodó képessége nagyon lecsökken, a környezetéből érkező információk "szűrten" jutnak el a pszichotikus állapotban levő egyénhez, s előfordulhat, hogy azokat is sajátosan értelmezi.

Gondolkodásában, az érzékelésében, érzelmi életében esetleg olyan részletek kaphatnak hangsúlyt átmenetileg, amelyek megváltoztatják viselkedését, környezetéhez való megszokott viszonyát felboríthatják. Ez jelentheti azt is, hogy az egyén gyanakvóbban szemléli maga körül az embereket, érezheti úgy, hogy vele ellenségesebbek. Nagy mértékű szorongás, félelmek jellemezhetik ebben az állapotban Önt.

Előfordulhat, hogy hangulata indokolatlanul "feldobott" lehet, nem érzi, hogy beteg lenne. Vannak ebben a pszichotikus zavarban olyan átmeneti állapotok is, melyeket jelentős közönyösség, kiürültség, magába forduló magatartás jellemezhet, esetleg családtagjai, az egészségügyi személyzet közeledését is elutasíthatja.

Egyes esetekben testi ápoltságára sem fordít kellő gondot, külsejét elhanyagolja. Feltétlenül kórházi kezelésre van szükség ennél a betegségnél. A kivizsgálás során - amennyiben szükségesnek látják, - gyógyszeres kezelésre is sor kerülhet, amelyeknek tartós szedése indokolt. Ha szorongás, belső feszültség is kíséri az Ön betegségét, szorongásoldásra is szükség lehet, melyre szorongásoldó gyógyszereket is alkalmazhatunk.

Osztályunkon a gyógyszeres - esetleg infúziós, injekciós - kezelés mellett pszichológiai vizsgálatok, egyéni és csoportos beszélgetések is segíthetik Önt a gyógyulásban.

A tartós gyógyszereszedés miatt szakorvosi ellenőrzésre lesz szükség a kórházi kezelést követően, ahol kezelőorvosa felmerült kérdéseire és problémáira választ ad.

Fontos, hogy tudja, ez, vagy ehhez hasonló lelki állapot egyes esetekben visszatérhet, ilyenkor esetleg éveken át gyógyszert kell szednie.

Döntő fontosságú, hogy Ön tartsa be az orvosi utasítást, önként ne változtasson a gyógyszeradagolásán, jelenjen meg a kontrollvizsgálatokon, egyszóval együttműködik kezelőorvosával.

A szükségessé váló gyógyszerek tartós szedésre vannak kifejlesztve, tehát hosszú időn keresztül szedve sem okoznak egészségkárosodást.

Múló bágyadság, szájszárazság, émelygés, stb. előfordulhatnak, ezek főleg a kezelés elején jelentkeznek. (4-5 nap múlva rendszerint elmúlnak). Bizonyos gyógyszerek tartós szedésekor merev járást, fokozott nyálélválasztást, végtagremegést tapasztalhat. Kellemetlenséget okozó tüneteit jelezze!

Az izomba alkalmazott injekciós kezelésnél hosszabb idő után enyhe nyomásérzékenység, kisebb duzzanat alakulhat ki. Ha ilyet észlel, szóljon!

Infúziónál fontos, hogy a tű kihúzása után legalább 6-8 percig szorítsa a vattát, miközben könyökét behajlítva tartja, így elkerülhető, hogy a bőr "bekékljön" a könyökhajlatban. Minden további kérdésére, felmerülő problémájára választ kaphat kezelőorvosától, az ápoló személyzettől, forduljon hozzájuk bizalommal!

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!