



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Személyiségzavarban szenvedő betegek részére

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Önt azért vettük fel osztályunkra, mert panaszainak és tüneteinek oka jórészt lelki eredetű. Ön jelenleg idegállapota tartós rosszabbodása miatt került kórházba, feltehető, hogy egy olyan pszichiátriai betegségben - a személyiségzavarban - szenved, melyre jellemző lehet, hogy az egyén alkalmazkodó képességét beszűkíti, mindennapi életét, munkavégzését, helytállását komolyan gátolja.

E betegséget - melynek több altípusa ismert - az is jellemezheti, hogy az Ön hangulata igen változékony, labilis, "apróságok" is felizgatják. Indulatok vezérlik a viselkedését, amelyeket nehezen ural.

Gyakori kísérő tünet az állandósuló "idegesség", a lazításra való képtelenség, nyugtalanság. Olykor úgy érezheti, Önt nem értik meg, s Ön is nehezebben hangolódik rá mások problémájára.

A személyiségzavarok gyakran, de nem mindig társulnak szubjektív "rossz-érzéssel", és megjelenhetnek a közösségi élet különböző területein - pl. család, munkahelyi kapcsolatok, stb. - nehézségek.

Kialakulásuk hátterében sokszor a gyermekkori fejlődés kisebb-nagyobb zökkenői állhatnak. Ezek lelki feldolgozása megkönnyítheti az egyén életét.

A kivizsgálás során - amennyiben szükségesnek látják, - gyógyszeres kezelésre is sor kerülhet, amelyeknek tartós szedése indokolt. Ha szorongás, belső feszültség is kíséri az Ön betegségét, szorongásoldásra is szükség lehet, melyre szorongásoldó gyógyszereket is alkalmazhatunk.

Osztályunkon a gyógyszeres - esetleg infúziós, injekciós - kezelés mellett pszichológiai vizsgálatok, egyéni és csoportos beszélgetések is segíthetik Önt.

A tartós gyógyszeres kezelés miatt szakorvosi ellenőrzésre lesz szükség a kórházi kezelést követően, ahol kezelőorvosa felmerült kérdéseire és problémáira választ ad.

Döntő fontosságú, hogy Ön tartsa be az orvosi utasítást, önként ne változtasson a gyógyszeradagolásán, jelenjen meg a kontrollvizsgálatokon, egyszóval együttműködik kezelőorvosával.

A szükségessé váló gyógyszerek tartós szedésre vannak kifejlesztve, tehát hosszú időn keresztül szedve sem okoznak egészségkárosodást.

Múló bágyadtság, szájszárazság, émelygés, stb. előfordulhatnak, ezek főleg a kezelés elején jelentkeznek. (4 -5 nap múlva rendszerint elmúlnak). Kellemetlenséget okozó tüneteit jelezze! Az izomba alkalmazott injekciós kezelésnél hosszabb idő után enyhe nyomásérzékenység, kisebb duzzanat alakulhat ki. Ha ilyet észlel, szóljon!

Infúziónél fontos, hogy a tű kihúzása után legalább 6-8 percig szorítsa a vattát, miközben könyökét behajlítva tartja. Így elkerülhető, hogy a bőr "bekéküljön" a könyökhajlatban. Minden további kérdésére, felmerülő problémájára választ kaphat kezelőorvosától, az ápoló személyzettől, forduljon hozzájuk bizalommal!

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!