

Marikhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
3300, Eger, Széchenyi u. 27-29. Tel:+36 36 411-444
Web: www.mfkh.hu

ANESZTEZIOLOGIAI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Név: Szül.:
TAJ: Lakcím:

Kérjük, hogy műtétet megelőzően, saját érdekében tartsa be a következőket:

- a műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon!
- altatóorvosa határozza meg, hogy
4 órával a műtét előtt még ihat folyadékot.
6 órával a műtét előtt még ehet könnyen emészthető ételt.
- kivehető fogprotézisét, kontaktlencsáját távolítsa el!
- ékszereit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- testékszereit (piercing) távolítsa el!

Altatás (általános érzéstelenítés) során a fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn.

A műtétet megelőzően tabletta vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. Ezt követően a kéz vénájába kanült vezetünk be, az altatást általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismétljük és/vagy altató gázokat adunk arcmaszk, gégemaszk illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigént és az altatógázok keverékét.

Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei

Minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegeknél is ritkák (Magyarországon 1:20 000 – 1:50 000). Az általános érzéstelenítés (altatás), mely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk. A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG, vér oxigéntelítettség mérő, vérnyomásmérő, stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

Az altatás, általános érzéstelenítés mellékhatásai és szövődményei:

Gyakori:

száraz torok
átmeneti zavartság, tájékozatlanság
hányinger, hányás
fejfájás, hátfájás
erős fájdalom a műtétet követően
átmeneti látászavar
szájsérülés

Ritka:

gyógyszerallergia
gégegörcs
gépek meghibásodása
véletlen ébrenlét
hányadék belégzés

Kevésbé gyakori:

nehéz légútbiztosítás
remegés, hidegrázás
fogsérülés

Nagyon ritka:

a légútbiztosítás kivitelezhetetlensége
szívmegállás
halálozás

A tájékoztatást követően felmerült kérdéseim és az arra kapott válaszok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az anesztéziával kapcsolatos általános és speciális tájékoztatást megkaptam. Az tartalmazta az anesztézia módjára, kivitelezésére, gyakoribb szövödményeire vonatkozó információkat. Ezt követően a fentebb részletezett kérdéseimre is kielégítő választ kaptam.

A fenti tájékoztatást követően a tervezett műtétemhez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyezem.

Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában önálló közlekedésre, jognyilatkozatra alkalmatlan vagyok, ez idő alatt alkoholt, kábítószer nem fogyaszthatok, altatót, nyugtatót és fájdalomcsillapító gyógyszert csak orvosi utasításra kaphatok.

Műtéti indikáció:	
Tervezett műtét:	
Ajánlott anesztézia:	
A páciens által választott anesztézia:	

Eger, :

.....
A felvilágosítást végző
orvos aláírása és pecsétje

.....
A beteg vagy törvényes
képviselőjének aláírása

1-M-1/383/2